

第3類醫藥品

止癢消炎藥 ラナケインS

販売名：ラナケインS

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

請勿用於下列部位：眼部周圍、黏膜等

諮詢事項

- 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 有藥物過敏史者
 - 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
 - 嬰幼兒
- 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

- 使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

發癢、接觸性皮膚炎、濕疹、蟲咬、皮膚炎、蕁麻疹、汗疹、潰瘍、凍瘡

用法、用量

1天數次，將本劑適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- 本產品僅供外用
- 相同部位請勿同時使用其他外用劑
- 請勿在患部或其周圍仍是不潔的情況下使用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
胺苯甲酸乙酯	5.0 g	(局部麻醉劑) 麻痺感覺神經，緩和發癢症狀
鹽酸二苯胺	2.0 g	(抗組織胺劑) 抑制產生搔癢感
異丙基甲基酚	0.1 g	(殺菌劑) 抑制患部周圍的雜菌孳發

添加物：液態石蠟、羊毛脂、二十二醇、肉荳蔻酸異丙酯、聚氧乙烯硬脂酸醚、聚氧乙烯十六烷基醚、對羥基苯甲酸、單硬脂酸甘油酯、聚乙二醇硬脂酸酯、聚二甲基矽氧烷、乙二胺四乙酸二鈉、甘油、亞硫酸鈉及香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於乾燥、陰涼處，避免陽光直射
(特別要避免放在暖器旁，或夏季的汽車內等極度高溫處)
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>