第 3 類醫藥品

止癢消炎藥　ラナケインＳ

販売名：ラナケインＳ

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

請勿用於下列部位：眼部周圍、黏膜等

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
   （1）正在接受醫生治療者
   （2）有藥物過敏史者
   （3）有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
   （4）嬰幼兒
2. 使用後如出現下列症狀，可能爲副作用所致，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 使用 5～6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

發癢、接觸性皮膚炎、濕疹、蟲咬、皮膚炎、蕁麻疹、汗疹、潰瘍、凍瘡

用法、用量

1 天數次，將本劑適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

（1）幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

（2）請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療

（3）本產品僅供外用

（4）相同部位請勿同時使用其他外用劑

（5）請勿在患部或其周圍仍是不潔的情況下使用

成分、含量

100g 中

成分	含量
胺苯甲酸乙酯	5.0 g
鹽酸二苯胺	2.0 g
異丙基甲基酚	0.1 g

添加物：液態石蠟、羊毛脂、二十二醇、肉荳蔻酸異丙酯、聚氧乙烯硬脂酸醚、聚氧乙烯十六烷基醚、對羥基苯甲酸、單硬脂酸甘油酯、聚乙二醇硬脂酸酯、聚二甲基矽氧烷、乙二胺四乙酸二鈉、甘油、亞硫酸鈉及香料

保管與使用相關注意事項

（1）請蓋緊瓶蓋並保存於乾燥、陰涼處，避免陽光直射
（特別要避免放在暖器旁，或夏季的汽車內等極度高溫處）
（2）請存放在幼兒拿不到的地方
（3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
（4）請避免接近火源

銷售商　小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。