

第2类医药品

皮肤外用薬 **さいき a 治療ローション**

販売名：さいき a

使用注意事項

禁止事項

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应）

下列人群请勿使用

- （1）患有出血性血液疾病（血友病、血小板减少症、紫斑病等）的人
- （2）即使极少量的出血也可能会引起严重后果的人（具有抑制血液凝固的作用，有可能促进出血）

咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - （1）正在接受医生治疗的人
 - （2）有药物等过敏史的人
 - （3）患部不干爽和溃烂严重的人
2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

干皮病、小儿干燥性皮肤、手指粗糙、手脚的干裂和皲裂、手肘・膝盖・脚跟・脚踝的角化症、冻疮（溃烂除外）、挫伤、扭伤后的肿胀、肌肉痛・关节痛、伤口及烫伤后的皮肤硬结・紧绷（面部除外）

用法、用量

请每天 1~数次，取适量涂于患部或涂抹在纱布等上后贴敷于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- （1）每次使用后请务必盖好瓶盖
- （2）幼儿请在监护人的监督指导下使用

- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。此外，如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 本品仅限外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3g	修复和调整肌肉细胞 滋润角质，增加柔软性
甘草酸二钾	0.5g	抑制皮肤炎症
尿囊素	0.2g	促进粗糙、干裂的皮肤组织的修复

辅料: 含有甘油、双丙二醇、1, 3-丁二醇、聚氧乙烯氢化蓖麻油、橄榄油、深海鲛鱼油、dl-吡咯烷酮羧酸钠、安息香酸、氢化大豆磷脂、黄原胶、胆固醇、L-天冬氨酸、甘氨酸、DL-丙氨酸、依地酸纳、棕榈酸、硬脂酸、油酸、山嵛酸、pH 调节剂及其他成分

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>