

第2類醫藥品

皮膚外用藥

さいき a 治療ローション

販売名：さいき a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板減少症、紫斑症等)者
- (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者(因有血液凝固抑制作用而助長出血的可能)

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
- (3) 濕潤和潰瘍嚴重者

2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 長疹子和發紅、發癢、腫脹 |

3. 若使用5~6日後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

乾皮症，幼童的乾燥性皮膚，手指乾燥，手腳皮膚裂開及龜裂，發生於手肘、膝蓋、腳後跟或腳踝上的角化症，凍瘡(潰瘍狀態除外)，挫傷、扭傷後的腫脹、肌肉痛、關節疼痛，受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起(臉部除外)

用法、用量

請每天使用1~數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼附於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 每次使用完請確實蓋緊瓶蓋
- (2) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗並立即接受眼科醫生診療

(4) 本產品僅供外用

成分、含量

100g 中

| 成分 | 含量 | 作用 |
|-------|------|-------------------------|
| 類肝素 | 0.3g | 修復和調整肌膚細胞 滋潤角質，賦予柔軟性 |
| 甘草酸二鉀 | 0.5g | 抑制皮膚發炎 |
| 尿囊素 | 0.2g | 幫助修復粗糙、裂開的皮膚組織 |

添加物：甘油、二丙烯甘醇、1,3 丙二醇、蓖麻油聚氧乙烯醚、橄欖油、角鯊烷、dl-咯烷酮羧酸鈉、苯甲酸、氫化大豆卵磷脂、黃原膠、膽固醇、L-天門冬胺酸、甘胺酸、DL-丙胺酸、乙二胺四乙酸二鈉、棕櫚酸、硬脂酸、油酸、山喻酸、pH 調節劑、其他 1 項成分

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>