

第2类医药品

皮肤外用药 **さいきん治療乳液**

販売名：さいきん

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

下列人群请勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板减少症、紫斑病等)的人
- (2) 即使极少量的出血也可能会引起严重后果的人(具有抑制血液凝固的作用, 有可能促进出血)

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物等过敏史的人
- (3) 患部不干爽和溃烂严重的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

干皮病、小儿干燥性皮肤、手指粗糙、手脚的干裂和皲裂、手肘・膝盖・脚跟・脚踝的角化症、冻疮(溃烂除外)、挫伤、扭伤后的肿胀、肌肉痛・关节痛、伤口及烫伤后的皮肤硬结・紧绷(面部除外)

用法、用量

请每天1~数次, 取适量涂于患部或涂抹在纱布等上后贴敷于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 每次使用后请务必盖好瓶盖
- (2) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。此外，如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 本品仅限外用

成分、含量 100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3 g	修复和调整肌肉细胞 滋润角质，增加柔软性
甘草酸二钾	0.5 g	抑制皮肤炎症
尿囊素	0.2 g	促进粗糙、干裂的皮肤组织的修复

辅料：含有 1, 3-丁二醇、二丙二醇、聚氧乙烯鲸蜡醚、山梨醇硬脂酸酯、硬脂醇、羧乙烯基聚合物、黄原胶、三辛酸甘油酯、石蜡油、鲸蜡醇棕榈酸酯、大豆油、胆固醇、苯甲酸、依地酸二钠、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>