

## 第2類醫藥品

皮膚外用藥

## さいき n 治療乳液

販売名：さいき n

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑症等）者
- (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因有血液凝固抑制作用而助長出血的可能）

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
  - (3) 濕潤和潰瘍嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

乾皮症，幼童的乾燥性皮膚，手指乾燥，手腳皮膚裂開及龜裂，發生於手肘、膝蓋、腳後跟或腳踝上的角化症，凍瘡（潰瘍狀態除外），挫傷、扭傷後的腫脹、肌肉痛、關節疼痛，受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起（臉部除外）

## 用法、用量

請每天使用1~數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼附於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請每次使用後，蓋緊瓶蓋
- (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療

## (4) 本品僅供外用

**成分、含量** 100g 中

成分	含量	作用
類肝素	0.3 g	修復和調整肌膚細胞 滋潤角質，賦予柔軟性
甘草酸二鉀	0.5 g	抑制皮膚發炎
尿囊素	0.2 g	幫助修復粗糙、裂開的皮膚組織

添加物：1,3-丁二醇、二丙烯甘醇、聚氧乙烯十六烷基醚、失水山梨醇硬脂酸酯、硬脂醇、羧乙烯聚合物、黃原膠、三異辛酸甘油酯、液態石蠟、十六酸十六酯、大豆油、膽固醇、安息香酸、乙二胺四乙酸二鈉、pH 調節劑

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>