

第 2 類醫藥品

痤瘡治療藥 セナキュア

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

請勿用於以下部位

眼睛及眼部周圍

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 對藥物有過敏反應者
- (3) 患部範圍過大者
- (4) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
- (5) 有很深的傷口及嚴重灼傷者
- (6) 有硬結（堅硬的硬塊）的重症患者

2. 使用後如出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、搔癢

3. 若連續使用 2 週後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

4. 其他

- (1) 在有傷口的情況下使用本藥劑時，會有刺激、刺痛等暫時性刺激感。若介意刺激感，請停止使用
- (2) 皮膚多少會因使用本藥劑而有點乾燥、發紅，此時請暫停使用，並在間隔一段時間後再度使用。

功能、效果

痤瘡

用法、用量

請每天 2 次（早、晚）適量塗抹於患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 請於使用前取少量塗抹於手腕內側等處靜待一晚，若第二天早上在塗抹部位出現過敏症狀（發疹、發紅、搔癢等），則請不要使用
- (2) 請遵守規定的用法、用量
- (3) 孩童使用時，請在監護人的指導下使用
- (4) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (5) 本品僅限外用

成分、含量

100g 中

水楊酸……0.5g

乙醇……22.84g

尿囊素……0.2g

添加物：1,3-丁二醇、甘油、對羥基苯甲酸、乙烯二胺四醋酸鈉、酸鹼調節劑

保管及使用注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器（可能造成誤用、品質產生變化）
- 請小心避免藥劑沾到衣服、寢具、家具、地板等（有些材質沾上後不易清除，或是發生變色、變質的狀況）
 - 若在剩餘量變少時倒著（倒置）使用，可能發生不易噴霧的狀況。此時，轉回正常位置空噴，即可恢復噴霧

嚴禁火源

第二石油類 危險等級Ⅲ

含有乙醇 水溶性

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>