

第2类医药品

中药制剂 シジラック

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 身体虚弱的人（体力衰弱，身体较弱的人）
 - 胃肠虚弱易腹泻的人
 - 有显著出汗倾向的人
 - 老年人
 - 曾因药物等原因出现过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
 - 有以下症状的人：排尿困难
 - 诊断为患有以下疾病的人：高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺功能障碍
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

- 若服用1个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等或略虚弱的以下症状：四十肩、五十肩、肩部酸痛、落枕

用法、用量

请按以下剂量，于餐前或餐间用水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	4片	3次
7岁以上不满15岁	3片	
5岁以上不满7岁	2片	
不满5岁	× 不可服用	

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3小时

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 本品容易受潮，每次服用后请务必拉好封口拉链
- (3) 幼儿请在监护人的监督指导下服用

成分、含量

每日用量（12片）中 含独活葛根汤提取物 2860 mg

<中草药换算量>

葛根 2.5 g、桂皮 1.5 g、芍药 1.5 g、麻黄 1.0 g、独活 1.0 g、生姜 0.5 g、地黄 2.0 g、
大枣 0.5 g、甘草 0.5 g

辅料：二氧化硅、CMC-Ca、滑石、硬脂酸镁、纤维素

●由于本品采用了天然物（中草药），因此片剂颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请务必拉好封口拉链，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>