

## 第2類醫藥品

## 中藥製劑 シジラック

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 身體虛弱者（體力衰退者，身體較弱者）
  - 胃腸虛弱易腹瀉者
  - 發汗傾向顯著的人
  - 高齡者
  - 至今曾因藥物等原因出現過起疹子、發紅、發癢等症狀者
  - 有以下症狀的人：排尿困難
  - 診斷出有以下症狀者：高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、胃部不適

- 若服用1個月左右，症狀仍無改善，請停止服用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力中等或略微虛弱者的以下症狀：四十肩、五十肩、肩頸痠痛、落枕

## 用法、用量

請依以下用量於飯前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	3次
7歲以上未滿15歲	3錠	
5歲以上未滿7歲	2錠	
5歲未滿	× 不可服用	

●餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時。

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 本藥劑容易受潮，每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- (3) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用

**成分、含量**

每天用量（12錠）中 獨活葛根湯萃取物 2860mg

<原生中藥換算量>

葛根 2.5g、桂皮 1.5g、芍藥 1.5g、麻黃 1.0g、獨活 1.0g、生薑 0.5 g、地黃 2.0g、大棗 0.5 g、甘草 0.5 g

添加物：二氧化矽、CMC-Ca、滑石、硬脂酸鎂、甲基纖維素

●本劑使用了天然物（生藥），錠劑顏色多少會有所差異

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>