

## 第2类医药品

## 中药制剂 生葉（しょうよう）漢方錠

販売名：生葉漢方内服薬

## 使用注意事項

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生、牙医治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的人
  - (3) 老年人
  - (4) 曾因药物等出现过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
  - (5) 有以下症状的人:浮肿
  - (6) 诊断为患有以下疾病的人：高血压、心脏病、肾病
2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部不适

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重

3. 若服用 5~6 天后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
4. 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商
5. 服用本药时，极少数患者会出现症状加重的情况，如果出现这种情况请持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

牙龈炎、扁桃体炎、化脓性皮肤疾病的初期或轻微症状

<功能与效果的相关注意事项>

任何体力状况均可使用

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间用水或温水服用

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	4片	3次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量的相关注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3个小时

## 成分、含量

每日剂量（12片）中 含排脓散与汤提取物 2.9 g（中草药换算量）

桔梗 2.0g 甘草 1.5g 大枣 1.5g 芍药 1.5g  
 生姜 0.5g 枳实 1.5g （辅料含无水硅酸）

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

- 由于本药采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

## 保管及使用注意事项

- （1）请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>