

第2類醫藥品

中藥製劑

生葉（しょうよう）漢方錠

販売名：生葉漢方内服薬

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫師、牙醫治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 高齡者
 - 曾因藥物出現過起疹、發紅、發癢等症狀者
 - 有下列症狀者：水腫
 - 接受過下列診斷者：高血壓、心臟病、腎病
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	胃部不適

偶有出現下列嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬之外，還出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

- 服用5~6天後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 如欲長期連續服用，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 服用本劑偶有症狀加重的情況，如果出現這種情況請持說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

牙齦炎、扁桃體炎、化膿性皮膚疾病的初期或輕症

<功能、效果相關注意事項>

與體力無關，均可使用

用法、用量

請在飯後或餐間用水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人(15 歲以上)	4 片	3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法、用量相關注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時。

成分、含量

每天用量（12 片）中 排膿散及湯萃取物 2.9g <原生藥換算量>

桔梗 2.0g 甘草 1.5g 大棗 1.5g 芍藥 1.5g
生薑 0.5g 枳實 1.5g （添加物：二氧化矽）

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、玉米澱粉

- 本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- （1）請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- （2）請存放在幼兒拿不到的地方
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- （4）請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>