第 3 类医药品

牙槽脓漏药 生葉（しょうよう）液薬

販売名：生葉液薬 a

使用注意事项

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商

（1）正在接受医生或牙医治疗的人

（2）有药物等过敏史的人

2. 若使用后出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
其他	味觉异常

3. 若使用 5～6 次后，症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

功能、效果

缓解牙龈炎与牙槽脓漏的诸症状（牙龈出血、发红、肿胀、化脓、疼痛、刺痒、口中黏腻、口臭）、口腔炎

用法、用量

牙龈炎、牙槽脓漏：1 日 2 次（早晚）刷牙后，用棉棒取适量（约 0.3g）本品，涂抹于牙龈

口腔炎：1 日 2～4 次，取适量本品，涂抹于患部

<用法与用量相关的注意事项>

（1）儿童请在监护人的监督指导下使用

（2）本品仅限用于牙科

成分、含量 （100g 中）

有效成分	含量	作用
桧木醇	0.1g	杀菌作用
氯化十六烷基吡啶鎓水合物	0.05g	杀菌作用
尿囊素	0.3g	组织修复作用
甘草酸二钾	0.4g	抗炎作用

辅料：依地酸 Ca/2Na、柠檬酸、聚山梨酯 80、薄荷油、木糖醇、香料、丙二醇、乙醇

保管及使用注意事项

（1）请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
（2）请将本品放在儿童接触不到的地方
（3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
（4）请勿靠近火源

使用方法

①在装入袋中的状态下，从杆的中间部位折断棉棒（仅取出使用的部分）
②将棉球浸泡在药液中（浸泡至棉球的根部）
③涂抹在患部（用过的棉棒请勿再次浸泡到药液中）

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 https://www.kobayashi.co.jp

中国語（簡体中文） 2025.01 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。