第 3 類醫藥品

牙齒痛、齒槽膿漏藥

生葉（しょうよう）液藥

販売名：生葉液藥 a

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售商諮詢

（1）正在接受醫生或牙醫治療者

（2）有藥物過敏史者

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
其他	味覺異常

3. 使用 5～6 次後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

緩和牙齦炎、齒槽膿漏的諸症狀（牙齦出血、發紅、腫脹、化膿、疼痛、發癢、口中黏膩、口臭）、口內炎。

用法、用量

牙齦炎、齒槽膿漏：1 天 2 次（早晚）刷牙後，用棉花棒取適量（約 0.3g）本劑，塗抹在牙齦上

口內炎：1 天 2～4 次，取適量本劑，塗抹在患部

<用法、用量相關注意事項>

（1）幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

（2）本劑僅限用於齒科

成分、含量 （100g 中）

有效成分	含量	作用
β-檜酚酮	0.1g	殺菌作用
氯化十六烷基吡啶	0.05g	殺菌作用
尿囊素	0.3g	組織修復作用
甘草酸二鉀	0.4g	抗發炎作用

添加物：乙二胺四乙酸二鈉鈣、檸檬酸、聚山梨醇酯 80、薄荷油、木糖醇、香料、丙二醇、乙醇

保管與使用相關注意事項

（1）請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射

（2）請存放在幼兒拿不到的地方

（3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

（4）請避免接近火源

使用方法

① 棉花棒在袋中的狀態下，從中間部分折斷（只取出需要的量）
② 將棉球浸泡在藥液中（浸泡至棉球的根部）
③ 請塗抹在患部（用過的棉棒請勿再次浸泡到藥液中）

銷售商　小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。