

第2类医药品

足癣、顽癣用药 **タムチンキパウダーinジェル**

販売名：タムチンキ P

**使用注意事項****禁止事項**

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

## 1. 请勿用于下列部位

- (1) 眼睛及眼睛周围、粘膜等(例如口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿润、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

**咨询事項**

## 1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 婴幼儿
- (3) 有药物过敏史的人
- (4) 患处在面部或范围广的人
- (5) 患处化脓的人
- (6) 不确定是“湿疹”还是“足癣、股癣、体癣”的人(如有阴囊瘙痒、溃烂等症状, 大多因湿疹等其他原因引起)

## 2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、刺激感

## 3. 若使用2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

**功能、效果**

足癣、腹癣、体癣

**用法、用量**

请每天1次, 取适量涂抹于患部

## 〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 请不要在未对患部及其周围进行清洁的情况下使用
- (2) 请注意防止本品溅入眼内。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗，并立即接受眼科医生的诊疗
- (3) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (4) 本品仅限外用

**其他注意事项**

- 本品呈白色乳霜状，是一种配合大量粉末以提高清爽感和速干性的白色凝胶处方
- 沾到手上的白色凝胶可用水和香皂冲洗干净

**成分、含量**

100g 中

成分	含量	成分
硝酸奥昔康唑	1g	杀灭白癣菌，促进患部治愈
利多卡因	2g	消除足癣、顽癣伴发的瘙痒
甘草酸	0.5g	消除炎症
L - 薄荷醇	1g	带来清凉感，缓解瘙痒

辅料：聚羧乙烯、玉米淀粉、氧化钛、滑石、BHT、二丙二醇、乙醇

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿接近火源（酒精含有物）

销售商 小林制药株式会社  
 大阪市中央区道修町 4-4-10  
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>