

第2類醫藥品

足癬、白癬用藥 **タムチンキパウダーinジェル**

販売名：タムチンキ P

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

- 請勿用於以下部位
 - 眼睛及眼部周圍、黏膜（例如口腔、鼻腔、陰道等）、陰囊、外陰部等
 - 濕疹
 - 潮濕、潰爛、裂開、外傷嚴重的患部

諮詢事項

- 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 嬰幼兒
 - 有藥物過敏史者
 - 患部在臉部或範圍廣的人
 - 患部化膿的人
 - 不確定罹患的是「濕疹」還是「香港腳、股癬、錢癬」的人（陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起）
- 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、皮疹、腫脹、刺激感

- 若使用2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

香港腳、股癬、錢癬

用法、用量

1天1次、請取適量塗抹在患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 請勿在患部及其周圍骯髒的情況下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用清水或溫水清洗，並立刻接受眼科醫生的診療
- (3) 孩童要使用時，請在成人的監護下使用
- (4) 本品僅限外用

其他注意事項

- 本劑為奶油狀白色凝膠處方，為提高乾爽感和速乾性，使用了大量粉末調製
- 黏在手上的白色凝膠請用水和肥皂沖洗掉

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
硝酸奧昔康唑	1g	殺滅白癬菌，促進患部治癒
利多卡因	2g	鎮靜香港腳、白癬伴隨的發癢
甘草次酸	0.5g	鎮靜發炎
L-薄荷醇	1g	帶來清涼感，緩和發癢

添加物：羧乙基聚合物、玉米澱粉、氧化鈦、滑石、BHT、二丙烯甘醇、乙醇。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請避免接近火源（本產品為酒精含有物）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>