第 2 类医药品

足癣、顽癣用药 **タムチンキパウダースプレーC**

販売名：タムチンキパウダースプレーC

使用注意事项

禁止事项

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应）

1．下列人群请勿使用

对本品或本品成分即洗必泰有过敏史的人

2．请勿用于下列部位

（1）眼睛及眼睛周围、粘膜（例如口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴部等

（2）湿疹

（3）患部不干爽、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

咨询事项

1．下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

（1）正在接受医生治疗的人

（2）婴幼儿

（3）有药物过敏史的人

（4）患处在面部或范围广的人

（5）患处化脓的人

（6）不确定是“湿疹”还是“足癣、股癣、体癣”（瘙痒、溃烂）（如有阴囊瘙痒、溃烂等症状，大多因湿疹等其他原因引起）

●患有或可能患有末梢血液循环障碍的人

2．使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持此容器向医生、药剂师或者注册经销商

有关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、刺激感、热感、疼痛、溃烂

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
休克 （过敏性反应）	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3．若使用 2 周后症状仍不好转，请停止使用，并持此容器向医生、药剂师或注册经销商

效能、效果

足癣、股癣、体癣

用法、用量

请每天数次，取适量喷于患处

〈用法与用量相关的注意事项〉

（1）请不要在未对患处及周围进行清洁的情况下使用

（2）请注意防止本品溅入眼内。

万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗，并立即接受眼科医生的诊疗

（3）幼儿请在监护人的监督指导下使用

（4）本品仅限外用

（5）使用前请摇匀

（6）请在距患处约 3cm 的高度进行喷涂

（7）使用后可能会出现冻伤，因此请不要对同一部位连续喷涂 1 秒以上

●请严格遵守用法、用量

成分、含量

100g 中

成分	含量
克霉唑	0.1g
利多卡因	0.25g
甘草酸二钾	0.1g
盐酸洗必泰	20mg
氧化锌	1g

辅料：异丙醇、滑石、肉豆蔻酸异丙酯、硬脂酸镁、LPG

保管及使用注意事项

（1）请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

（2）请将本品放在儿童接触不到的场所

（3）请不要接近火源

●请不要用沾有本品的手接触眼睛或粘膜

●本品可能会软化合成树脂或溶化涂料，请留意不要粘染到家具或地板等上

●量少时可能会难以排出，此时应以直立或倒立的方式使用

●请不要放置在车内、日光直射的场所以及供暖器具（暖炉、暖风机等）附近，否则有温度上升造成破裂的危险

注意避开火源和高温

本产品是一种使用高压气体的可燃性产品，应遵守以下注意事项，否则会发生危险。

1. 不可在火焰或火源附近使用。
2. 不可在生火的室内大量使用。
3. 不可放在阳光直射或靠近火源等温度不低于 40℃的场所，否则可能会因温度过高导致产品爆裂。
4. 不可放入火中。
5. 完全用光后再将其废弃。

高压气体：LPG

严禁烟火

易燃性固体　危险等级 III

含异丙醇物质 7 g

●废弃时请在没有火源的室外按下按钮排气，直至喷射声消失后再废弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 https://www.kobayashi.co.jp

中国語（簡体中文）　2022.08 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。