

第2类医药品

足癬、顽癬用药 タムチンキパウダースプレーC

販売名：タムチンキパウダースプレーC

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用

对本品或本品成分即洗必泰有过敏史的人

2. 请勿用于下列部位

- (1) 眼睛及眼睛周围、粘膜(例如口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等
- (2) 湿疹
- (3) 患部不干爽、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 婴幼儿
- (3) 有药物过敏史的人
- (4) 患处在面部或范围广的人
- (5) 患处化脓的人
- (6) 不确定是“湿疹”还是“足癬、股癬、体癬”(瘙痒、溃烂)(如有阴囊瘙痒、溃烂等症状, 大多因湿疹等其他原因引起)

● 患有或可能患有末梢血液循环障碍的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

有关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、刺激感、热感、疼痛、溃烂

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用2周后症状仍不好转, 请停止使用, 并持本包装咨询医生、药剂师或注册经销商

效能、效果

足癣、股癣、体癣

用法、用量

请每天数次，取适量喷于患处

〈用法与用量相关的注意事项〉

(1) 请不要在未对患处及周围进行清洁的情况下使用

(2) 请注意防止本品溅入眼内。

万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗，并立即接受眼科医生的诊疗

(3) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

(4) 本品仅限外用

(5) 使用前请摇匀

(6) 请在距患处约 3cm 的高度进行喷涂

(7) 使用后可能会出现冻伤，因此请不要对同一部位连续喷涂 1 秒以上

● 请严格遵守用法、用量

成分、含量

100g 中

成分	含量
克霉唑	100mg
利多卡因	250mg
甘草酸二钾	100mg
盐酸洗必泰	20mg
氧化锌	1000mg

辅料：异丙醇、滑石、肉豆蔻酸异丙酯、硬脂酸镁、LPG

保管及使用注意事项

(1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

(2) 请将本品放在儿童接触不到的场所

(3) 请不要接近火源

● 请不要用沾有本品的手接触眼睛或粘膜

● 本品可能会软化合成树脂或溶化涂料，请注意不要沾染到家具或地板等上

注意避开火源和高温

● 废弃时请在没有火源的室外按下按钮排气，直至喷射声消失后再废弃

高压气体：LPG

严禁烟火 易燃性固体 危险等级 III

含异丙醇物质 7 g (70g 产品)

含异丙醇物质 12 g (120g 产品)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>