第 2 類醫藥品

足癬、白癬用藥　タムチンキパウダースプレーC

販売名：タムチンキパウダースプレーC

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

1. 以下人士請勿使用
   曾因本藥劑或本藥劑內的成分氯己定而引起過敏症狀者
2. 請勿用於以下部位
   (1) 眼睛或眼睛的周圍、黏膜、(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等部位
   (2) 濕疹
   (3) 潮濕、潰爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
   (1) 正接受診療者
   (2) 幼童
   (3) 有藥物過敏史者
   (4) 患部在臉上或是範圍廣泛者
   (5) 患部已化膿者
   (6) 不確定罹患的是「濕疹」還是「足癬、股癬、錢癬」者（陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多爲濕疹等其他的原因所引起）
   ●有末梢血液循環障礙或可能患有此疾病者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能爲副作用，請立即停止使用，並持本容器向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、皮疹、腫脹、刺激感、熱感、疼痛、潰爛

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀

3. 若使用 2 周左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本容器向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

足癬、股癬、錢癬

用法、用量

請每天數次適量噴塗於患部

＜用法與用量的注意事項＞

(1) 患部上或是其周圍有汙垢時請勿使用

(2) 注意不要噴入眼睛。萬一噴入眼睛時，請立即用水或溫水清洗，並接受眼科醫生的診療

(3) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用

(4) 本產品僅供外用

(5) 使用前請充分搖晃瓶身

(6) 請從距離患部約 3cm 處進行噴塗

(7) 請勿於同一處連續噴塗 1 秒以上，可能會有凍傷的危險

●請務必遵守用法及用量

成分、含量

100g 中

成分	含量
克催瑪汝	0.1g
利多卡因	0.25g
甘草酸二鉀	0.1g
氯己定	20mg
氧化鋅	1g

添加物：異丙醇、滑石、肉豆蔻酸異丙脂、硬脂酸鎂、LPG

保管與使用相關注意事項

(1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處

(2) 請存放在幼兒拿不到的地方

(3) 請不要靠近火源

●請勿以沾有本藥劑的手觸碰眼睛或黏膜

●由於本藥劑可能會軟化合成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

●當內容物減少而難以排出時，請正放或倒置使用

●請勿置於車內、陽光直射的場所或暖氣器具（暖爐、暖風扇等）等物品附近，以免因溫度上升而引起破裂的危險

火源與高溫的相關注意事項

本商品爲使用高壓氣體的可燃性產品，請遵守下列事項，避免發生危險。

1. 請勿靠近火焰或火源使用。
2. 請勿在用火的室內空間裡大量使用。
3. 因高溫會導致破裂的危險，請避免置於陽光直射處或火源附近等溫度超過 40 度的場所。

4. 請勿置於火中。
5. 請於使用完畢後丟棄。

高壓氣體：LPG

嚴禁火源

易燃性固體　危險等級Ⅲ

本產品爲異丙醇含有物 7g

●丟棄前，請先至沒有火源的戶外按壓噴頭、抽出內部的氣體，直到不再發出噴射音後再丟棄

銷售商　小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

中国語（繁体中文）　2022.08 作成

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。