

第2類醫藥品

足癬、白癬用藥 **タムチンキパウダースプレーC**

販売名：タムチンキパウダースプレーC

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 以下人士請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑內的成分氯己定而引起過敏症狀者

2. 請勿用於以下部位

- (1) 眼睛或眼睛的周圍、黏膜、(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等部位
- (2) 濕疹
- (3) 潮濕、潰爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正接受診療者
 - (2) 幼童
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 患部在臉上或是範圍廣泛者
 - (5) 患部已化膿者
 - (6) 不確定罹患的是「濕疹」還是「足癬、股癬、錢癬」者（陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起）
- 有末梢血液循環障礙或可能患有此疾病者

2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、皮疹、腫脹、刺激感、熱感、疼痛、潰爛

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀

3. 若使用2周左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

足癬、股癬、錢癬

用法、用量

請每天數次適量噴塗於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 患部上或是其周圍有污垢時請勿使用
 - (2) 注意不要噴入眼睛。萬一噴入眼睛時，請立即用水或溫水清洗，並接受眼科醫生的診療
 - (3) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
 - (4) 本產品僅供外用
 - (5) 使用前請充分搖晃瓶身
 - (6) 請從距離患部約 3cm處進行噴塗
 - (7) 請勿於同一處連續噴塗 1 秒以上，可能會有凍傷的危險
- 請務必遵守用法及用量

成分、含量

100g 中

成分	含量
克催瑪汝	100mg
利多卡因	250mg
甘草酸二鉀	100mg
氯己定	20mg
氧化鋅	1000mg

添加物：異丙醇、滑石、肉豆蔻酸異丙脂、硬脂酸鎂、LPG

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請不要靠近火源
- 請勿以沾有本藥劑的手觸碰眼睛或黏膜
- 由於本藥劑可能會軟化合成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

火源與高溫的相關注意事項

- 丟棄前，請先至沒有火源的戶外按壓噴頭、抽出內部的氣體，直到不再發出噴射音後再丟棄。

高壓氣體：LPG

嚴禁火源 易燃性固體 危險等級Ⅲ

本產品為異丙醇含有物 7g (70g 產品)

本產品為異丙醇含有物 12g (120g 產品)

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>