

第②类医药品

足癬、顽癬用药 タムチンキパウダースプレーZ

販売名：タムチンキパウダースプレー Z

使用注意事項

禁止事項

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或引起不良反应）

1. 下列人群不要使用

曾因本剂或本剂的成分而引起过敏的人

2. 不要用于以下部位

- （1）眼睛及眼睛周围、面部、粘膜（例如口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴部等
- （2）湿疹
- （3）患处不干爽、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- （1）正在接受医生治疗的人
- （2）孕妇或可能怀孕的人
- （3）婴幼儿
- （4）有药物过敏史的人
- （5）患处范围较大的人
- （6）患处化脓的人
- （7）不确定是“湿疹”还是“足癬、股癬、体癬”（瘙痒、溃烂）（如有阴囊瘙痒、溃烂等症状，大多因湿疹等其他原因引起）
 - 患有或可能患有末梢血液循环障碍的人

2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

有关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒、肿胀、刺激感、落屑、溃烂、水泡、龟裂

3. 若使用两周后症状仍不好转，请停止使用，并持本包装咨询医生、药剂师或注册经销商

效能、效果

足癬、股癬、体癬

用法、用量

请每天 1 次适量喷于患处

〈用法与用量相关的注意事项〉

(1) 请不要在未对患处及周围进行清洁的情况下使用

(2) 请注意防止本品溅入眼内。

万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗，并立即接受眼科医生的诊疗

(3) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

(4) 本品仅限外用

(5) **使用前请摇匀**

(6) 请在距患处**约 3cm** 的高度进行喷涂

(7) **使用后可能会出现冻伤，因此请不要对同一部位连续喷涂 1 秒以上**

● 请严格遵守用法、用量

● 请注意防止直接吸入

成分、含量

100g 中

成分	含量
盐酸丁萘芬	200mg
利多卡因	500mg
甘草次酸	200mg
薄荷醇	200mg
苯扎氯铵	10mg

辅料：肉豆蔻酸异丙酯、酒精、滑石粉、氧化钛、玉米淀粉、BHT、DME

保管及使用注意事项

(1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

(2) 请将本品放在儿童接触不到的场所

(3) 请不要接近火源

● 请不要用沾有本品的手接触眼睛或粘膜

● 本品可能会软化合成树脂或溶化涂料，请留意不要沾染到家具或地板等上

注意避开火源和高温

● 废弃时请在没有火源的室外按下按钮排气，直至喷射声消失后再废弃

高压气体：DME

严禁烟火 第一石油类 危险等级 II

含酒精物质 14g (70g 产品)

含酒精物质 24g (120g 产品)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>