

## 第②類醫藥品

足癬、白癬用藥 **タムチンキパウダースプレーZ**

販売名：タムチンキパウダースプレー Z

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

## 1. 以下人士請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑內的成分而引起過敏症狀者

## 2. 請勿用於以下部位

- (1) 眼睛或眼睛的周圍、臉部、黏膜、(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等部位
- (2) 濕疹
- (3) 潮濕、潰爛、龜裂或外傷嚴重的患部

## 諮詢事項

## 1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正接受診療者
- (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (3) 幼童
- (4) 有藥物過敏史者
- (5) 患部範圍廣泛者
- (6) 患部已化膿者
- (7) 不確定罹患的是「濕疹」還是「足癬、股癬、錢癬」者（陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起）

●有末梢血液循環障礙或可能患有此疾病者

## 2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、發炎、腫脹、刺激感、落屑、潰爛、起水疱、龜裂

## 3. 若使用2周左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

足癬、股癬、錢癬

## 用法、用量

1天1次以適量噴塗於患部

## &lt;用法與用量的注意事項&gt;

- (1) 患部上或是其周圍有污垢時請勿使用
  - (2) 注意不要噴入眼睛。萬一噴入眼睛時，請立即用水或溫水清洗，並接受眼科醫生的診療
  - (3) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
  - (4) 本產品僅供外用
  - (5) 使用前請充分搖晃瓶身
  - (6) 請從距離患部約3cm處進行噴塗
  - (7) 請勿於同一處連續噴塗1秒以上，可能會有凍傷的危險
- 請務必遵守用法及用量
  - 請注意並避免直接吸入

## 成分、含量

100g 中

成分	含量
鹽酸布蝶啶	200mg
利多卡因	500mg
甘草酸	200mg
l-薄荷醇	200mg
苯扎氯銨	10mg

添加物：肉豆蔻酸異丙酯、乙醇、滑石、二氧化鈦、玉米澱粉、BHT、DME

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
  - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
  - (3) 請不要靠近火源
- 請勿以沾有本藥劑的手觸碰眼睛或黏膜
  - 由於本藥劑可能會軟化成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

## 火源與高溫的相關注意事項

- 丟棄前，請先至沒有火源的戶外按壓噴頭、抽出內部的氣體，直到不再發出噴射音後再丟棄。

高壓氣體：DME

嚴禁火源 第一石油類 危險等級 II

乙醇含有物 14g (70g 產品)

乙醇含有物 24g (120g 產品)

銷售商 小林製藥株式會社

大阪府中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>