

第2类医药品

中药制剂 テイラック

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 曾经因药物出现过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

- 若服用1个月左右（用于急性胃肠炎、宿醉时5~6次，用于水样性腹泻、中暑时5~6天）后，症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

不论体力如何均可服用，伴有口渴尿少、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、头痛、浮肿等中任意症状的如下诸症：水样性腹泻、急性胃肠炎（里急后重^注请勿服用）、中暑、头痛、浮肿、宿醉

注）里急后重是指有残便感，反复出现伴有腹痛的便意

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或两餐之间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人（15岁以上）	4片	3次
5岁以上不满15岁	2片	
不满5岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- 请严格遵守规定的用法、用量
- 幼儿请在监护人的监督指导下服用

●餐间是指“两餐之间”指餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量（12片）中

含五苓散提取物……………2.3g

〈从以下中草药中提取〉	
泽泻……………5.0g	猪苓……………3.0g
茯苓……………3.0g	白术……………3.0g
桂皮……………2.0g	

辅料：交联羧甲基纤维素钠、二氧化硅、CMC-Ca、滑石、硬脂酸镁、纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、巴西棕榈蜡

●由于本品使用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避光阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 1包分次使用时，应将剩余药剂的袋口折叠2次以上妥善保管
此外，保管的剩余药剂要在当天服用或扔掉

销售商 小林制药株式会社
大阪府中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>