

第2類醫藥品

中藥製劑

テイラック

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

- 若服用約1個月左右（用於急性胃腸炎、宿醉時則5~6次，用於水樣腹瀉、中暑時則5~6天）症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

不論體力如何均可使用，口渴、尿少、且伴隨眩暈、想吐、嘔吐、腹痛、頭痛、水腫等任意症狀的下列各症狀：水樣腹瀉、急性胃腸炎（裡急後重^注請勿使用）、中暑、頭痛、水腫、宿醉

注）裡急後重是指有殘便感，反覆出現伴隨腹痛的便意。

用法、用量

飯前或餐間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	1天3次
5歲以上未滿15歲	2錠	
未滿5歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

一天用量（12錠）中

五苓散精華…………… 2.3g

澤瀉……………5.0g	豬苓……………3.0g
茯苓……………3.0g	白朮……………3.0g
桂皮……………2.0g	中萃取

添加物：交聯羧甲基纖維素鈉、二氧化矽、CMC-Ca、滑石、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、巴西棕櫚蠟

●由於本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 如欲將1包藥分次服用，保存剩餘的藥劑時，請將袋口折2次以上
此外，存放的剩餘藥物請在當日內服用或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>