

第2类医药品

中药制剂 **チクナイン a (顆粒)**

販売名: チクナイン a

## 使用注意事項

## 咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 身体虚弱的人（体力衰弱的人、身体较弱的人）
  - 胃肠虚弱且身体虚寒的人
- 服用后如出现下列症状，因由可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

| 相关部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 消化系统 | 食欲不振、胃部不适 |

极少数人会引发以下严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

| 症状的名称      | 症状   |
|------------|--|
| 间质性肺炎      | 上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止 |
| 肝功能障碍      | 出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等状况             |
| 肠系膜静脉硬化性肠炎 | 因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等状况                             |

- 若服用一个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等程度以上，鼻涕浓稠、偶尔伴随燥热感的以下症状：鼻塞、慢性鼻炎、蓄脓症（鼻窦炎）

**用法、用量**

请按照以下剂量，于早晚、餐前或餐间以水或温水送服

| 年 龄          | 单次剂量   | 每日服用次数 |
|--------------|--------|--------|
| 成人(15 岁以上)   | 1 包    | 2 次    |
| 7 岁以上不满 15 岁 | 2/3 包  |        |
| 4 岁以上不满 7 岁  | 1/2 包  |        |
| 2 岁以上不满 4 岁  | 1/3 包  |        |
| 不满 2 岁       | × 不可服用 |        |

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
  - (2) 儿童请在监护人的监督指导下服用
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约2~3小时

**成分、含量**

每日用量(2包:4g)中

含辛夷清肺汤提取物 2.0g

<从以下中草药中提取>

辛夷 1.5g 知母 1.5g 百合 1.5g

黄芩 1.5g 山栀子 0.75g 麦门冬 3.0g

石膏 3.0g 升麻 0.75g 枇杷叶 0.5g

辅料：硅酸铝、蔗糖脂肪酸酯、硬脂酸镁、乳糖

- 由于本剂采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

**保管与使用注意事项**

- (1) 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 1包分开服用时，剩余的药剂应折起袋口保管  
另外，保管的剩余药剂请在当天内服用或扔掉

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>