

第2类医药品

中药制剂

チクナインb（錠剤）

販売名：チクナインb

使用注意事項

咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 身体虚弱的人（体力衰弱的人、身体较弱的人）
 - 胃肠虚弱且身体虚寒的人
- 服用后如出现下列症状，因由可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
消化系统	食欲不振、胃部不适

极少数人会引发以下严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸（皮肤和白眼珠变黄）、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状
肠系膜静脉硬化性肠炎	因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状

- 若服用1个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等程度上，鼻涕浓稠、偶尔伴随燥热感的以下症状：鼻塞、慢性鼻炎、蓄脓症（鼻窦炎）

用法、用量

请按照以下剂量，于早晚、餐前或餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	4片	2次
7岁以上不满15岁	3片	
5岁以上不满7岁	2片	
不满5岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 儿童请在监护人的监督指导下服用
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量(8片)中

含辛夷清肺汤提取物 2.0g

<从以下中草药中提取>

辛夷	1.5g	知母	1.5g	百合	1.5g
黄芩	1.5g	山栀子	0.75g	麦门冬	3.0g
石膏	3.0g	升麻	0.75g	枇杷叶	0.5g

辅料：无水硅酸，硅酸铝、CMC-Ca，硬脂酸镁，玉米淀粉

- 由于本剂采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处请保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本药剂
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>