

第2類醫藥品

中藥製劑

チクナインb（錠劑）

販売名：チクナインb

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 身體虛弱者（體力衰退者、身體較弱者）
 - 胃腸虛弱且身體虛寒者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
消化器官	食慾不振、胃部不適

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀
腸系膜靜脈硬化性大腸炎	因長期服用而反覆出現腹痛、腹瀉、便秘、腹脹等症狀

- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等程度以上，出現濃稠鼻涕、偶爾伴隨發熱感者的以下症狀：鼻塞、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法、用量

請按照以下劑量，於早晚、餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	1 天 2 次
7 歲以上未滿 15 歲	3 錠	
5 歲以上未滿 7 歲	2 錠	
未滿 5 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 讓幼兒服用時，請於監護人的監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量(8 錠)中

含辛夷清肺湯萃取物 2.0g

<從以下藥材萃取>

辛夷	1.5g	知母	1.5g	百合	1.5g
黃芩	1.5g	梔子	0.75g	麥門冬	3.0g
石膏	3.0g	升麻	0.75g	枇杷葉	0.5g

添加物：無水矽酸，矽酸鋁、CMC-Ca，硬脂酸鎂，玉米澱粉

- 由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色會有少許差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑
- (5) 瓶中的充填物是用來防止藥劑在運送時受損的，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>