

## 第2类医药品

## 鼻炎用滴鼻液 チクナインc 点鼻スプレー

販売名：チクナインc

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用  
曾因本剂或本剂的成分而引起过敏的人
2. 请勿长期连续使用

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 有药物过敏史的人
  - (4) 诊断为患有以下疾病的患者：高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼
2. 使用中或使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
鼻子	肿胀、刺激感

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用约3天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

缓解因急性鼻炎、过敏性鼻炎或鼻窦炎引起的以下各症状：鼻塞、鼻涕、打喷嚏、头沉重

## 用法、用量

按照下述量向鼻腔内喷雾。每次使用请间隔3小时以上。

年 龄	单次剂量	使用次数
成人(15 岁以上)	喷雾 1~2 次	1 天 1~5 次
7 岁以上不满 15 岁		
不满 15 岁	× 不可使用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 若过度使用反而会引起鼻塞
- (2) 幼儿使用时，须在监护人的监督指导下使用
- (3) 仅限用于滴鼻

<使用方法>

1. 使用前轻轻擤鼻涕（擤鼻涕时请不要用力过度）
2. 取下瓶盖，手持容器（第一次使用时，请务必反复按压直至液体喷出）
3. 轻轻将喷嘴前端插入鼻腔后，药液喷雾 1~2 次。对另一个鼻腔也重复同样的操作
4. 为保持容器清洁，使用后用纸巾等擦拭与鼻子接触的部分，然后再盖紧瓶盖
  - 若容器横向使用，药液将无法形成雾状，使用时请务必朝上
  - 若用针等戳刺喷嘴前端，折断时将非常危险，请勿尝试

### 成分、含量

100ml 中

成分	含量	作用
盐酸萘甲唑啉	0.05g	收缩鼻粘膜血管，抑制肿胀，改善鼻塞
马来酸氯苯那敏	0.5g	抑制鼻涕、鼻塞症状
利多卡因	0.5g	缓解鼻炎引起的疼痛或瘙痒
甘草酸二钾	0.3g	减轻鼻部发炎
苯扎氯铵	0.02g	抑制鼻粘膜的细菌生长

辅料：甘油、pH 调节剂

### 保管和使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 不要与他人共用

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>