

第2類醫藥品

鼻炎用點鼻藥 **チクナインc 点鼻スプレー**

販売名：チクナインc

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士禁用
曾因本藥劑或本藥劑內的成分而引起過敏症狀者
2. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生診療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 診斷為下列疾病的患者：高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺機能障礙、青光眼
2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
鼻子	腫脹、刺激感

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 若使用約3天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

緩和因急性鼻炎、過敏性鼻炎或副鼻腔炎導致之下列各項症狀：鼻塞、流鼻水、打噴嚏、頭重

用法、用量

請依下列劑量噴於鼻腔內。此外，使用頻率請間隔3小時以上。

年 齡	一次劑量	使用次數
成人（15 歲以上）	每次噴霧 1~2 次	每天 1~5 次
7 歲以上未滿 15 歲		
未滿 7 歲	× 不可使用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 若是過度使用，可能反而會引發鼻塞
- (2) 幼兒使用時需，請在監護人的指導監督下使用
- (3) 請只使用於點鼻

<使用方法>

1. 使用前請輕輕擤鼻子（請勿用力擤鼻）
 2. 請取下瓶蓋並手持容器（初次使用請務必重覆按壓至液體流出）
 3. 請將噴嘴前端輕輕放入鼻腔，噴藥液 1~2 次。另一邊鼻腔也請以同樣方式重覆操作
 4. 為保持容器清潔，使用後請以面紙等清潔用品擦拭接觸鼻子的部分後，再蓋緊瓶蓋
- 藥水在容器橫置時將無法呈現霧狀，使用時請務必朝上
 - 請絕對不要以針等尖銳物品戳刺噴嘴前端，斷裂時會非常危險

成分、含量

100ml 中

成分	含量	作用
鹽酸萘甲唑啉	0.05g	使鼻腔黏膜血管收縮、抑制腫脹、改善鼻塞
馬來酸氯苯那敏	0.5g	改善鼻水、鼻塞等症狀
利多卡因	0.5g	緩和鼻炎導致的疼痛和搔癢
甘草酸二鉀	0.3g	舒緩鼻炎
苯扎氯銨	0.02g	抑制鼻腔黏膜細菌增生

添加物：甘油、酸鹼調節劑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 勿與他人共用

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>

中国語（繁体中文） 2023.09 作成

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。