

第2类医药品

足癬、頑癬用药 **タムシチンキ**

販売名：小林タムシチンキ b

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于下列部位

- (1) 眼睛及眼睛周围、粘膜(例如口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿润、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 婴幼儿
- (3) 有药物过敏史的人
- (4) 患处在面部或范围广的人
- (5) 患处化脓的人
- (6) 不确定是“湿疹”还是“足癬、股癬、体癬”的人(如有阴囊瘙痒、溃烂等症状, 大多因湿疹等其他原因引起)

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、刺激感、落屑、溃烂、干燥、紧绷感、水疱

3. 若使用2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

足癬、股癬、体癬

用法、用量

请每天数次, 取适量涂抹于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 请不要在未对患部及其周围进行清洁的情况下使用
- (2) 请注意防止本品溅入眼内。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗，并立即接受眼科医生的诊疗
- (3) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (4) 本品仅限外用

成分、含量

100ml 中

成分	含量	成分	含量
硝酸咪康唑	1 g	马来酸氯苯那敏	0.2g
水杨酸	4 g	利多卡因	2 g
异丙基甲基苯酚	0.3g	d1-樟脑	1.5g

辅料：含有乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
 - (4) 请勿接近火源（酒精含有物）
 - (5) 请勿使用过期产品
- 即使在使用期限内，为保证产品质量，开封后请尽快使用
 - 本品可能会软化合成树脂或溶化涂料，请留意不要沾染到家具或地板等上

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>