

第2類醫藥品

足癬、白癬用藥

タムシチンキ

販売名：小林タムシチンキb

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 請勿用於以下部位
 - (1) 眼睛及眼部周圍、黏膜（例如口腔、鼻腔、陰道等）、陰囊、外陰部等
 - (2) 濕疹
 - (3) 潮濕、潰爛、裂開、外傷嚴重的患部

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 嬰幼兒
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 患部在臉部或範圍廣的人
 - (5) 患部化膿的人
 - (6) 不確定罹患的是「濕疹」還是「香港腳、股癬、錢癬」的人（陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起）
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|-------------------------------------|
| 皮膚 | 長疹子和發紅、發癢、皮疹、腫脹、刺激感、落屑、潰爛、乾燥、僵硬感、水泡 |

3. 若使用2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

香港腳、股癬、錢癬

用法、用量

- 1 天好幾次、請取適量塗抹在患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 請勿在患部及其周圍骯髒的情況下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用清水或溫水清洗，並立刻接受眼科醫生的診療
- (3) 孩童要使用時，請在成人的監護下使用
- (4) 本品僅限外用

成分、含量

100ml 中

| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
|--------|------|---------|------|
| 硝酸咪康唑 | 1 g | 馬來酸氯苯那敏 | 0.2g |
| 水楊酸 | 4 g | 利多卡因 | 2 g |
| 異丙基甲基酚 | 0.3g | DL-樟腦 | 1.5g |

添加物：乙醇

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
 - (4) 請避免接近火源（本產品為酒精含有物）
 - (5) 請勿使用過期的產品
- 即使在使用期限內，為保證產品品質，開封後請儘快使用
 - 由於本藥劑可能會軟化成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>