

## 第②类医药品

## 解热镇痛药 ウラック

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应及事件)

1. 下列人群请勿服用
  - (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
  - (2) 服用本品或其他解热镇痛药、感冒药后出现过哮喘的人
  - (3) 未满 15 岁的儿童
  - (4) 预产期 12 周以内的孕妇
2. 服用本品期间, 请勿服用以下任何医药品  
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
3. 服用前后请勿饮酒
4. 请勿长期连续服用

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生或牙医治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 处于哺乳期的妇女
  - (4) 老年人
  - (5) 有药物过敏史的人
  - (6) 有以下症状的人: 浮肿
  - (7) 诊断患有以下疾病的人: 高血压、心脏病、肾病、肝病、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病
  - (8) 曾患过以下疾病的人: 胃十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、克罗恩病
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、淤青
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振、胃部不适感、胃痛、口腔炎、烧心、胃胀、胃肠出血、腹痛、腹泻、血便
精神神经系统	眩晕
循环系统	心悸

相关部位	症状
呼吸系统	气短
其他	眼花、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血难止、出血、背痛、体温过低、全身乏力

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
皮肤黏膜眼综合症 (史-约综合症)、中毒性表皮坏死松解症	高热、眼睛充血、眼屎、口唇溃烂、咽喉疼痛、皮肤大范围出疹与发红等症状的持续出现或突然加重
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤及白眼球发黄)、褐色尿、全身乏力、食欲不振等症状
肾功能障碍	出现发热、皮疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛(骨节疼痛)、腹泻等症状
无菌性脑膜炎	出现颈部肌肉僵硬伴发剧烈头痛、发热、恶心·呕吐等症状(此类症状多见于接受系统性红斑狼疮或混合性结缔组织病治疗的人)
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重
哮喘	出现呼吸时有哮鸣音，呼吸困难等症状
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤黏膜苍白、疲劳感、心悸、气短、身体不适眩晕、血尿等症状
粒细胞缺乏症	出现突然高热、发冷、咽喉痛等症状

- 服用后有可能出现下列症状，如症状持续或加重，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商：便秘
- 服用 5~6 次后，症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

### 功能、效果

- 头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、挫伤痛、骨折痛、扭伤痛、月经痛(生理痛)、外伤痛的镇痛
- 恶寒、发热时的解热

### 用法、用量

请按以下剂量，以 1 日 3 次为限，用水或温水送服，尽量避免空腹服用。

服用间隔请保持 4 小时以上

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	3 片	最多 3 次
不满 15 岁	× 不可服用	

## 〈用法与用量的相关注意事项〉

请严格遵守规定的用法与用量

**成分、含量**

每日用量（9片）中

成分	含量	作用
布洛芬	450 mg	解热镇痛成分
芍药提取物	500 mg (原草药换算量 2.5g)	缓和肌肉紧张的成分
甘草提取物	350 mg (原草药换算量 2.5g)	抗炎成分
干燥氢氧化铝凝胶	250 mg	胃粘膜保护成分

辅料：无水硅酸、乳糖、玉米淀粉、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、氧化钛、聚乙二醇、三氧化二铁、巴西棕榈蜡

**保管及使用注意事项**

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>