

第2类医药品

中药制剂 ユービケア

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在使用前请向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - 正在接受医师治疗的人
 - 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - 容易上火、面部潮红且体力充沛的人
 - 高龄者
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人
 - 有以下症状的人：浮肿
 - 被诊断为以下疾病的人：高血压、心脏病、肾病
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
其他	心悸、上火、潮热、口舌发麻

本品偶尔会引发以下严重症状，此时请立即接受医师的治疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重

- 服用约一个月后症状仍无好转，请停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询
- 长期连续服用时，请向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

伴随体虚导致手脚冰冷僵硬、尿量少、不定时心悸、眩晕、肌肉颤抖的以下病症：关节痛、神经痛

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
7岁以上未满15岁	2/3包	
4岁以上未满7岁	1/2包	
2岁以上未满4岁	1/3包	
未满2岁	× 不可服用	

<用法与用量的相关注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 幼儿应在监护人的监督指导下服用
- 餐间意为“两餐之间”，指饭后约2~3小时

成分、含量

每日用量(3包:4.5g)中 桂枝加苓术附汤提取物···2.4g

〈从以下中草药中提取〉	
桂皮·····2.0g	芍药·····2.0g
大枣·····2.0g	生姜·····0.5g
甘草·····1.0g	白术·····2.0g
茯苓·····2.0g	附子粉·····0.25g

辅料：二氧化硅、羟丙基纤维素、乳糖

- 由于本剂采用了天然产物（草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 若1包分多次服用时，剩下的药剂请将药袋的封口至少折两折后存放
此外，存放的剩余药剂，请于当天服用完毕或丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>