

第2類醫藥品

中藥製劑 ユービケア

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 容易上火、臉部潮紅且體力充足的人
 - 高齡者
 - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
 - 有下列症狀者：水腫
 - 接受過以下診斷的人:高血壓、心臟病、腎病
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
其他	心悸、上火、潮熱、口唇舌頭發麻

偶有出現以下嚴重症狀的情況。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

- 若服用約一個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

伴隨體虛導致手腳冰冷僵硬、尿量少、不定時心悸、眩暈、肌肉抽筋等以下病症：關節痛、神經痛

用法、用量

飯前或兩餐之間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	1 天 3 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量(3 包:4.5g)中 桂枝加苓朮附湯萃取物…… 2.4g

桂皮 2.0g	芍藥 2.0g
大棗 2.0g	生薑 0.5g
甘草 1.0g	白朮 2.0g
茯苓 2.0g	附子粉 0.25g

中萃取

添加物：二氧化矽、羥丙甲纖維素、乳糖

- 由於本劑使用了天然物（草藥），顆粒的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 若 1 包分多次服用時，剩下的藥劑請將藥袋的封口折 2 折以上來存放
此外，存放的剩餘藥劑，請於當天內服用完畢或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>