

第2类医药品

中药制剂 漢方ズッキノン

販売名：ズッキノン

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 胃肠虚弱且身体虚寒的人
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

- 若服用一个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等，有慢性头痛、肩部僵硬、眩晕等表现的以下诸症：慢性头痛、神经症、有高血压倾向

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	1包	2次
不满15岁	× 不可服用	

<用法用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3个小时

成分、含量

每日用量（2包：4.4g）中 含钓藤散提取物（1/2量）…2.5 g

<中草药换算量>

钓藤钩	•••••	1.5 g	陈皮	•••••	1.5 g	半夏	•••••	1.5 g
麦门冬	•••••	1.5 g	茯苓	•••••	1.5 g	人参	•••••	1.0 g
防风	•••••	1.0 g	菊花	•••••	1.0 g	甘草	•••••	0.5 g
生姜	•••••	0.5 g	石膏	•••••	2.5 g			

辅料：硅酸铝、硬脂酸镁、乳糖

●本品采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请不要服用过期产品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>