

第 2 類醫藥品

中藥製劑 漢方ズッキノン

販売名：ズッキノン

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 胃腸虛弱，有手腳冰冷者
 - (4) 曾因藥物等原因出現過長疹子、發紅、發癢等症狀者
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、胃部不適

3. 服用 1 個月左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等，患有伴隨慢性頭痛、肩頸酸痛、眩暈等的下列症狀：慢性頭痛、神經症、高血壓傾向

用法、用量

飯前或餐間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	2 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法、用量相關注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（2包：4.4 g）中，釣藤散萃取物（1/2 量）…2.5 g

<原生藥換算量>

嘴葉鉤藤 …………… 1.5 g	陳皮 …………… 1.5 g	半夏 …………… 1.5 g
麥門冬 …………… 1.5 g	茯苓 …………… 1.5 g	人參 …………… 1.0 g
防風 …………… 1.0 g	菊花 …………… 1.0 g	甘草 …………… 0.5 g
生薑 …………… 0.5 g	石膏 …………… 2.5 g	

添加物：矽酸鋁、硬脂酸鎂、乳糖

●本劑使用了天然藥物（生藥），顆粒的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿使用過期的產品

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>