

第3类医药品

经皮吸收镇痛药

## 塗るズッキノン軟膏

販売名：ズッキノン a

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位

- (1) 眼睛及眼睛周围(太阳穴等)、粘膜等
- (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口

## 咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物等过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

头痛、颈强直、肌肉痛、神经痛、腰痛、牙痛、风湿病、关节痛、挫伤、扭伤

## 用法、用量

请取适量本品涂于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 每次使用后, 请务必盖紧瓶盖
  - (2) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
  - (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
  - (4) 本品仅限外用
- 请勿使用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂抹部位
  - 皮肤敏感的人请勿连续涂抹于同一部位

●请勿涂抹于额头及太阳穴（有可能进入眼睛里）

**成分、含量** 100 g 中

水杨酸甲酯 . . . 12 g      1-薄荷醇 . . . 6 g      桉树油 . . . 2 g

辅料：松节油、硬脂酸、硬脂醇、单硬脂酸甘油酯、十六烷基硫酸钠、丙二醇、三乙醇胺、羧乙烯基聚合物、香料

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>