

第3類醫藥品

經皮吸收鎮痛劑

塗るズッキノン軟膏

販売名：ズッキノン a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

下列部位不可使用

- (1) 眼睛及眼部周圍(太陽穴等)、黏膜等
- (2) 濕疹、長疹子、傷口

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 有藥物過敏史者
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

3. 使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

頭痛、肩頸酸痛、肌肉痛、神經痛、腰痛、牙痛、風濕病、關節疼痛、挫傷、扭傷

用法、用量

取適量本劑塗在患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 每次使用後蓋緊蓋子
 - (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
 - (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請馬上用清水或溫水沖洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
 - (4) 本劑僅限外用
- 塗擦部位請勿用保鮮膜等透氣性差的東西覆蓋
 - 皮膚較脆弱者請勿在同一部位連續使用

●請勿塗抹在額頭及太陽穴上（有可能會跑進眼睛裡）

成分、含量

100g 中

水楊酸甲酯 . . . 12g 1-薄荷醇 . . . 6g 桉樹油 . . . 2g

添加物：松節油、硬脂酸、硬脂醇、單硬脂酸甘油酯、十六烷基硫酸鈉、丙二醇、三乙醇胺、
羧乙烯基聚合物、香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>