使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

LANACANE G
Anti-Itch Gel

販売名：ラナケイン　G　　鎮痒消炎薬

⚠使用上の注意

⊠してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）次の部位には使用しないこと：目の周囲、粘膜等

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（3）湿潤やただれのひどい人（4）乳幼児
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効能・効果〉かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮ふ炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

〈用法・用量〉1日数回、患部に適量を塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉
（1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること（2）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること（3）外用にのみ使用すること（4）同じ部位に他の外用剤との併用はさけること（5）患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

〈成分・分量〉100g中
ジフェンヒドラミン1g、リドカイン2g、l-メントール4g
添加物として、尿素、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、BHT、エタノール、リン酸を含有する

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

〈保管及び取扱い上の注意〉
（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること（2）小児の手の届かない所に保管すること（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）（4）火気に近づけないこと（エタノール含有物）

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

MADE IN JAPAN

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北44-66

税 控除 対象

火気厳禁

引火性固体 危険等級Ⅲ
エタノール含有物