1日1回で効く

ジュクジュク水虫に

タムチンキ パウダースプレーZ

使用前によく振ること

乾燥させて治す

イメージ図

かゆみ止めリドカイン＋

殺真菌成分配合

ブテナフィン塩酸塩 水虫・たむし用薬

効能・効果 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

70g

第②類医薬品

小林製薬

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください Powder Medicine for Athlete's Foot

⚠使用上の注意 使用期限（缶底に記載）を過ぎた製品は使用しないこと

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
1. 次の人は使用しないこと：本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないこと（1）目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等（2）湿疹（3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）乳幼児（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（5）患部が広範囲の人（6）患部が化膿している人（7）「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）●末梢血行障害がある、又はあると思われる人 **2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**：皮ふ：発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量 1日1回、患部に適量を噴霧してください <用法・用量に関連する注意>（1）患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと（2）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること（3）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること（4）外用にのみ使用すること（5）使用前によく振ること（6）患部まで約3cmの距離で噴射すること（7）凍傷等の恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと●用法・用量を厳守すること●直接吸い込まないように注意すること **成分・分量** 100g中ブテナフィン塩酸塩0.2g、リドカイン0.5g、グリチルレチン酸0.2g、l-メントール0.2g、ベンザルコニウム塩化物10mg 添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、BHT、DMEを含有する **保管及び取扱い上の注意**（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりしめて保管すること（2）小児の手の届かない所に保管すること（3）火気に近づけないこと●本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと●本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようにすること●少なくなると、出にくくなることがあるので、そのときは正立又は倒立で使用すること●車内や直射日光の当たる場所、暖房器具（ストーブ、ファンヒーター等）の付近等には、温度が上がり破裂する危険があるため置かないこと

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1. 炎や火気の近くで使用しないこと。2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。4. 火の中に入れないこと。5. 使い切って捨てること。
高圧ガス：DME

●捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

火気厳禁

第一石油類
危険等級Ⅱ
エタノール
含有物
17mL
プラスチック：
キャップ、
外装フィルム

あったらいいな／をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北44-66

税 控除 対象

MADE IN JAPAN 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931