

販売名: チクナインa

漢方製剤

第2類医薬品

Medicine for Empyema

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸虚弱で冷え症の人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間に水又はお湯で服用してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日2回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	× 服用しないこと	

ちくのう症

副鼻腔炎

チクナイン^a

製品特徴

●ちくのう症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎を改善する内服薬です ●9種類の生薬からなる漢方「辛夷清肺湯」の働きで、鼻の奥の炎症を鎮めながら、膿を出して治します ●1日2回で効く、服用しやすい顆粒剤です

成分・分量

1日量(2包:4.0g)中
 辛夷清肺湯エキス(1/2量)
 …2.0g
 シンイ…1.5g、
 チモ…1.5g、
 ビヤクゴウ…1.5g、
 オウゴン…1.5g、
 サンシシ…0.75g、
 バクモンドウ…3.0g、
 セッコウ…3.0g、
 ショウマ…0.75g、
 ビワヨウ…0.5gより抽出

添加物として、ケイ酸Al、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症:鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

「あったらいいな」をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

副作用被害救済制度

MADE IN JAPAN

☎0120-149-931